

## **Pflichttext Marbox® 100 mg/ml Deutschland**

**Marbox 100 mg/ml:** Injektionslösung für Rinder und Schweine

### **Wirkstoffe und sonstige Bestandteile:**

1 ml enthält: Marbofloxacin 100,0 mg

### **Anwendungsgebiete:**

#### **Rind:**

Zur therapeutischen Behandlung von Atemwegserkrankungen, die durch Marbofloxacin-empfindliche Stämme von *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* und *Histophilus somni* verursacht werden. Zur therapeutischen Behandlung von akuter Mastitis während der Laktationsperiode, die durch Marbofloxacin-empfindliche Stämme von *E. coli* verursacht wird.

#### **Sau:**

Zur Behandlung des Mastitis-Metritis-Agalaktie-Syndroms, das durch Marbofloxacin-empfindliche Bakterienstämme verursacht wird.

### **Gegenanzeigen:**

Nicht anwenden bei Tieren mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Marbofloxacin oder anderen (Fluor-)Chinolonen. Nicht anwenden in Fällen von bestätigter oder vermuteter Resistenz gegenüber Fluorchinolonen (Kreuzresistenz).

### **Nebenwirkungen:**

Die intramuskuläre Injektion kann bei Rindern vorübergehend lokale Reaktionen wie Schmerzen und leichte entzündliche Veränderungen an der Injektionsstelle (die zu Fibrosen führen) verursachen. Die Narbenbildung setzt rasch ein (von Fibrose bis zur Synthese extrazellulärer Matrix und Kollagen) und kann mindestens 15 Tage lang andauern.

Die subkutane Anwendung kann leichte bis mittelgradige Ödeme an der Injektionsstelle hervorrufen. Eine mittelgradige Schmerzreaktion bei Betasten der Injektionsstelle kann bei einigen Tieren auftreten.

Bei Schweinen können nach intramuskulärer Anwendung schnell vorübergehende, leichte Ödeme und mittelgradige Entzündungsreaktionen an der Injektionsstelle auftreten, die für 12 Tage nach der Injektion andauern.

Bei Rindern und Schweinen wurden keine anderen Nebenwirkungen beobachtet.

### **Wartezeit:**

#### **Rind:**

Nach intramuskulärer Anwendung - Essbare Gewebe: 3 Tage, Milch: 72 Stunden

Nach subkutaner Anwendung - Essbare Gewebe: 6 Tage, Milch: 36 Stunden

#### **Schwein:**

Nach intramuskulärer Anwendung - Essbare Gewebe: 4 Tage

## **Verschreibungspflichtig!**

**Pharmazeutischer Unternehmer:** Ceva Tiergesundheit GmbH, Kanzlerstr. 4, 40472  
Düsseldorf, Deutschland

