

Pflichttext

Resporc FLU 3® - Deutschland

Resporc FLU 3®: Suspension zur Injektion für Schweine. Eine Impfdosis (2 ml) enthält:

Wirkstoffe und sonstige Bestandteile:

Stämme von inaktiviertem Influenza A Virus/Schwein/Bakum/IDT1769/2003 (H3N2) 0,21 mg \geq 10,53 log₂ GMNU1, Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1) \geq 10,22 log₂ GMNU1, Bakum/1832/2000 (H1N2) \geq 12,34 log₂ GMNU1. Adjuvans: Carbomer 971 P NF 2,0 mg, Konservierungsmittel: Thiomersal

Anwendungsgebiete:

Aktive Immunisierung von Schweinen einschließlich trächtiger Sauen ab einem Alter von 56 Tagen gegen Schweineinfluenza, verursacht durch die Subtypen H1N1, H3N2 und H1N2, zur Reduzierung klinischer Symptome und der Virusbelastung der Lungen nach einer Infektion. Beginn der Immunität: 7 Tage nach der Grundimmunisierung. Dauer der Immunität: 4 Monate bei Schweinen, die zwischen dem 56. und dem 96. Lebenstag geimpft wurden und 6 Monate bei Schweinen, die am 96. Lebenstag oder danach erstmals geimpft wurden. Aktive Immunisierung trächtiger Sauen nach Abschluss der Grundimmunisierung durch Verabreichung einer Einzeldosis 14 Tage vor dem Abferkeln, um eine hohe kolostrale Immunität zu erzielen, welche die Ferkel für mindestens 33 Tage nach der Geburt vor klinischen Erkrankungen schützt.

Gegenanzeigen:

Keine

Nebenwirkungen:

Eine vorübergehende leichte Schwellung, die sich innerhalb von 2 Tagen zurückbildet, kann nach der Impfung in sehr seltenen Fällen an der Injektionsstelle auftreten. Sehr selten kann nach der Impfung ein vorübergehender leichter Anstieg der Körpertemperatur beobachtet werden. („Sehr selten“ entspricht einer Häufigkeit von Nebenwirkungen von weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschließlich Einzelfallberichten).

Wartezeit:

Null Tage.

Verschreibungspflichtig!

Pharmazeutischer Unternehmer: Ceva Tiergesundheit GmbH, Kanzlerstr. 4, 40472 Düsseldorf, Deutschland